

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DEBARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 1 de 63

INSTRUCTIVO: el siguiente formato es para ser registrado en este, el Documento Consolidado de PAT Colectivo que da evidencia del ejercicio investigativo desarrollado por el colectivo (docentes y estudiantes) del nivel de formación (semestre o año). En esta consideración el documento consolidado de PAT Colectivo, debe contener:

Portada

1. Ficha de Identificación

Facultad: Ciencias de la salud		Colectivo Docente	Asignatura
Programa: Enfermería			
Semestre:	Periodo académico:	1. Lesly Beleño 2. Álvaro Quintana 3. Diana Marsiglia 4. Geidy Garces Arrieta	1. Salud sexual y reproductiva 2. Fisiología 3. Metodología de la investigación 4. Fundamentos básicos del cuidado I
II semestre	IP-2023		
Docente Orientador del seminario			
Geidy Garces Arrieta			
Título del PAT Colectivo			
Percepción del riesgo sobre infección por VIH en hombres de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena			
Núcleo Problémico			
Gestión del cuidado en la población vulnerable con enfoque de género.			
Línea de Investigación			
Salud pública, comunitaria y ambiental			

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 2 de 63

2. Informe del Proyecto Académico de Trabajo Colectivo (PAT Colectivo)

RESUMEN

Introducción: La infección por el VIH es un proceso crónico irreversible, que se asocia a un riesgo aumentado de diversos problemas de salud. **Objetivo:** Determinar la percepción del riesgo sobre infección por VIH en hombres de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena **Metodología:** Se trata de una investigación del tipo descriptiva de corte transversal, realizada con 409 hombres de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena. Se analizaron los datos sociodemográficos y percepción del riesgo por VIH. **Resultados:** los entrevistados eran hombres, entre 18 y 30 años (88%). Los hombres narraron en mayor número que están convencidos que los hombres con VIH pueden infectar a las mujeres 89.7%, consideran que efectivamente la enfermedad de VIH amenaza con la vida de las personas un 88.2%, un 46.8% piensa que existe un tratamiento médico puede prevenir el VIH, y el 82.9% cree que es importante usar condones al omento de tener relaciones sexuales para evitar VIH. **Conclusión:** Fue posible determinar la percepción del riesgo sobre infección por VIH en hombres de la localidad 2 de Cartagena En principio– la caracterización sociodemográfica de los hombres residentes de la localidad 2, así se pudo concluir con respecto a los niveles de percepción se caracterizaron porque tiene un nivel de 153– 195 considerándose alto.

Palabras claves: Percepción, Prevención de Enfermedades Transmisibles Salud del Hombre, VIH (DeCS)

Abstract

Introduction: HIV infection is a chronic irreversible process, which is associated with an increased risk of various health problems. **Objective:** To determine the perception of risk of VIH infection in men from locality 2 of the city of Cartagena **Methodology:** This is a descriptive cross-sectional investigation, carried out with

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIENE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 3 de 63

409 men from locality 2 of the city of Cartagena. Sociodemographic data and perception of VIH risk were analyzed. Results: the interviewees were men, between 18 and 30 years old (88%). Men narrated in greater numbers that they are convinced that men with HIV can infect women 89.7%, they consider that HIV disease effectively threatens the lives of people 88.2%, 46.8% think that there is a medical treatment that can prevent HIV, and 82.9% believe that it is important to use condoms when having sex to avoid VIH. Conclusion: It was possible to determine the perception of risk of VIH infection in men from town 2 of Cartagena. In principle - the sociodemographic characterization of the men residing in town 2, thus it could be concluded with respect to the levels of perception, they were characterized because he has a level of 153–195 being considered high.

Keywords: Perception, Prevention of Communicable Diseases, Men's Health, HIV

	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 4 de 63

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El VIH infecta y destruye las células del sistema inmunitario, produciendo un deterioro progresivo de las defensas del organismo [1], a la etapa final de este se le denomina sida, que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus, no todas las personas con VIH desarrollan sida [2]. Este virus se puede transmitir por el contacto con la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales de personas infectadas [1]. En cuanto a la población más expuesta a esta infección encontramos distintos grupos claves, los cuales son: trabajadores sexuales y sus clientes, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero y sus parejas sexuales, representando el 70 % de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial [3]. Según los informes presentados por la ONU referente al sida, exponen que 38.4 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo donde 650.000 han muerto por esta enfermedad en lo que corrió del año 2021 [3].

De acuerdo a los estudios a nivel internacional en Yucatán señalan que la condición migratoria representa un mayor riesgo de adquirir VIH/sida y que las condiciones estructurales de desigualdad propician una mayor vulnerabilidad ante esta díada, donde el 65%, lo relacionaron con enfermedades transmitidas por vía sexual, como mortal y contagiosa, sin embargo, llama la atención que el 14.4% de los hombres mayas migrantes no saben cómo se transmite el VIH/sida, lo que los coloca en una situación de riesgo permanente. En cuanto a la prevención, el 75% de los hombres encuestados conoce que el uso del condón es el método adecuado para la prevención del VIH/sida, el 59.7% creían que el VIH se podía transmitir por la picadura de un mosquito y el 43.2% manifestó que también podían contagiarse por un beso en la boca con alguien ya infectado [4].

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINÚE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 5 de 63

Lo observado en un estudio sobre los niveles de conocimientos y actitudes sobre VIH-SIDA del personal Policial de la Comisaria Sectorial de Chota, México, mostro que 66,3% tiene un nivel de conocimiento medio, y un 26,3% alto. En cuanto a las actitudes el 91,2% tiene una actitud positiva; la actitud negativa es mayor en las mujeres alcanzando 12,5%. El 66,7% de los hombres presenta conocimiento medio y 26,4% bajo. Las mujeres muestran conocimiento medio con 62,5%, aquellos con conocimiento medio y conocimiento alto 90,5% muestran una actitud positiva. Se concluye la ausencia de relación entre nivel de conocimiento y actitud hacia el VIH/SIDA. [5]. Ahora bien, un estudio realizado en Villavicencio arrojó que la enfermedad de VIH llegó a 103 casos en el mes de agosto del 2018, de los cuales 14 se registraron fallecidos. La población más afectada abarca entre las edades de 20 a 34 años; en términos de sexo los hombres fueron los principales infectados con 82 casos, sumado a esto, se observaron que el 45% presenta conocimientos deficientes sobre este tema, el 46,1% no se consideran susceptibles para contraer la enfermedad y el 49,5% muestra baja autoeficacia para la prevención [6].

Según un estudio realizado por el Dadis, en Cartagena, las personas entre 20 y 44 años acumulan el 73% de los casos de VIH/SIDA en el año 2022, siendo el sexo masculino el que presenta la mayoría de las infecciones con un 73,5% del total. Con base a dichos resultados se arrojó una tasa de incidencia acumulada para el año 2022 en la ciudad de Cartagena evidenciando un 40,09 caso por cada 100 mil habitantes, mientras que para el período del 2021 fue de un 31,99 caso por cada 100 mil habitantes [7]. Por lo anterior se identifica que existen un alto índice de contagio de la enfermedad por VIH /SIDA en el sexo masculino, además de poco conocimiento y actitud negativa frente la enfermedad, al tener en cuenta los panoramas descritos anteriormente en torno al VIH/ Sida, queda claro que, el grupo de población objeto de estudio requiere de una información asertiva de los niveles de percepción, esto muestra la importancia de fortalecer las distintas

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 6 de 63

estrategias de orientación y educación para la prevención de la infección por VIH entre los hombres de las diferentes zonas de la ciudad por lo que nos planteamos la siguiente interrogante.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles es la percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena?

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 7 de 63

JUSTIFICACION

Actualmente las enfermedades de transmisión sexual como él (VIH), se ha establecido como uno de los problemas de salud pública más grave a nivel mundial, siendo este una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en hombres cobrando acerca de 40,1 millones de vida [8]. De igual manera se debe tener en cuenta que los hombres afectados por VIH sida, cuentan con los conocimientos previos ante la infección e inclusive saben cuáles son los cuidados adecuados, permitiéndoles así prevenir el riesgo de padecer esta enfermedad [8].

A medida que avanza el tiempo y las tecnologías, se ha podido evidenciar una reducción de casos de VIH en la población en general, sin embargo, aún se mantienen cifras muy elevadas y con más prevalencias en los hombres homosexuales, el cual es un gran problema porque tienen conocimientos con respecto al cómo actuar ante las relaciones sexuales en cuanto a sus protecciones, sin embargo, la mayoría de los hombres no emplean adecuadamente dichos recursos para consigo mismo [9].

De igual manera se encontró la vinculación de los hombres homosexuales con la clandestinidad, como un factor determinativo que aporta condiciones y a su vez hace difícil la adopción de conductas de prevención ante VIH y que, además crea un escenario donde el intercambio afectivo no tiene un lugar propicio para su desarrollo. "Muchos de los espacios en los cuales los hombres tienen relaciones homosexuales clandestinamente (por ejemplo, calles, parques, automóviles, cines, saunas) harían muy difícil la incorporación del condón, en tanto otros riesgos estarían presentes; además, el actuar con rapidez sería visto como necesario" [10].

Esta investigación busca mostrar la percepción de riesgo que tienen los hombres en cuanto a la infección del VIH, así mismo identificar el problema y las estrategias que favorezcan la propagación de dicha enfermedad, para poder disminuir ese alto índice de morbilidad y mortalidad en la población debido al mal uso de los conocimientos sobre el tema del VIH, siendo esto ajustado a la normatividad de la

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 8 de 63

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Por eso es de gran importancia entender la percepción que tienen los hombres sobre el VIH, ya que esta nos permitirá conocer la vulnerabilidad de los implicados, las conductas que estos asumen, los mitos y creencias en los que se encuentran envueltos y hasta la apreciación que tiene frente a la responsabilidad en la prevención de la infección por VIH, lo que puede acarrear un aumento en la susceptibilidad de estos individuos ya que ellos piensan que los mecanismos de prevención para la enfermedad solo se usan cuando se establecen relaciones coitales no confiables con otros individuos[11].

A partir de la información suministrada anteriormente, este ejercicio investigativo es relevante, debido a que proporciona conocimientos generando un impacto significativo en hombres con riesgo ante esta enfermedad por desconocimiento y falta de responsabilidad en su vida sexual. Haciendo énfasis al hecho de que a nivel local en la ciudad de Cartagena se evidencia pocos estudios realizados que muestren acerca de la percepción de riesgo de los hombres de la enfermedad por VIH.

Con el desarrollo de este estudio se beneficiarán:

- Los hombres de la localidad 2 de Cartagena de Indias: puesto que la información que se logre generar y producir por medio de la intervención del programa de enfermería, servirá para identificar la percepción de la población involucrada para generar alternativas que lleven a promover un mejor manejo de la enfermedad.
- Corporación universitaria Rafael Núñez: Gracias a la intervención del programa de enfermería se continuará consolidando su imagen de compromiso social con esta población de estudio mediante talleres, capacitaciones y acompañamiento, para darles a entender cuáles son esos conocimientos y percepción de riesgo por la infección por VIH en los hombres de la localidad 2 de la ciudad Cartagena y se mitigue estas afecciones de salud.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 9 de 63

- El programa de Enfermería de la CURN: En la medida en que los futuros profesionales de enfermería se empoderan de un aspecto esencial de la profesión el cual consiste en contribuir al cuidado de la población. En este caso no lo harán de modo directo sino a través de la manipulación en cuanto a la información y generación de conocimiento que a mediano o largo plazo sirva para mejorar la cotidianidad, de la población en general.
- El equipo investigador de este estudio: Porque aplicará de manera eficaz y concreta los diferentes conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de los semestres de formación en el programa de Enfermería de la CURN, para comprender mucho mejor las diversas situaciones que alteran seriamente el bienestar de los hombres, y así de esta manera lograr contribuir a ese avance investigativo que realiza la salud pública con el fin de mejorar el bienestar de la población en general.
- Este estudio realizado en la CURN servirá de gran ayuda a la línea de investigación de salud pública, ya que permitirá conocer cuáles son los niveles de conocimiento que tienen los hombres ante el virus del VIH, así mismo permitirá la construcción de ideas que ayuden en la promoción y prevención de dicha enfermedad, con el fin de generar el bienestar de la población sujeto de estudio.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 10 de 63

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Determinar la percepción del riesgo sobre infección por VIH en hombres de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena IP 2023

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Caracterizar los aspectos sociodemográficos de los hombres de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena
- Identificar el nivel de percepción en hombres frente al riesgo de infección por VIH.
- Describir la percepción del riesgo sobre infección por VIH en los hombres de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINÚE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 11 de 63

MARCO TEÓRICO

1. MARCO TEÓRICO

1.1 ESTADO DEL ARTE

1.1.1 INTERNACIONALES:

Título: Conocimientos y percepción de riesgo de estudiantes de Estomatología frente al VIH/sida.

Autores: Ceballos M, Hernández F, Delgado L, Romero A, Abad A.

Año de publicación: 2022.

Ámbito geográfico: Cuba.

Resumen: Introducción: Partiendo que la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la epidemia que más ha marcado el desarrollo del mundo entero globalización. Históricamente, la epidemia del SIDA se ha distinguido entre: Diferencia, abuso, marginación, tabú, estigma y discriminación. Por consiguiente, en cuba se reportaron en el año 2022, 199 casos nuevos de infección por VIH y 152 en 2019; el sexo masculino fue el más afectado, en consecuencia, de la infección por VIH/SIDA, de esta forma han sido varios los estudios que se han desarrollado en el medio educación sexual, comenzando así por explorar el grado de conocimiento, percepción y peligros que viven los jóvenes y adolescentes en relación con la sexualidad y las infecciones de transmisión sexual (1).

Como resultado, en 2018 se notificaron 1,7 millones de nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo. A finales de año, se estimaba que 37,9 millones de personas vivían con el VIH y 770.000 personas habían muerto a causa de este virus. De hecho, en el Caribe, aproximadamente 340.000 personas viven con el VIH; Igualmente en este mismo año se diagnosticaron aproximadamente 16.000 nuevos casos de la enfermedad y se registraron 6.700 defunciones. De igual

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 12 de 63

importancia en Cuba se reportaron 199 nuevas infecciones por el VIH en este mismo año y 152 casos en 2019; siendo los hombres los más afectados (1).

Análisis: Este artículo nos aporta en nuestro trabajo investigativo, ya que fortalece nuestros conocimientos y el saber de las demás personas, por medio de la educación a la sexualidad, siendo esto un gran aporte significativo para la sociedad ya que muchas veces no tenemos ese conocimiento completo o claro de las problemáticas sexuales que nos rodean, en este caso hablando del VIH/SIDA. Por lo que de este se decide llevar su desarrollo en Cuba, investigando para poder promover y prevenir enfermedades.

Título: Encuesta en línea de comportamiento sexual y prácticas de prevención del virus de inmunodeficiencia humana en varones gais y hombres que tienen sexo con hombres en Uruguay.

Autores: Cabrera S, Pérez L, Meré JJ, Pérez D, Miranda C, Cavallieri F.

Año de publicación: 2022

Ámbito geográfico: Uruguay.

Resumen: introducción: Por otra parte, se realizó un estudio de análisis transversal en Uruguay utilizando una encuesta en línea a nivel nacional de homosexuales y otros HSH de octubre a diciembre de 2019 (80 días). Los criterios de inclusión fueron: hombres de 15 a 49 años que tuvieron relaciones sexuales con otros hombres en el último año. De manera que la persistencia de situaciones de discriminación y violencia hacia varones gais/HSH necesita acciones más efectivas de promoción de derechos. De modo que es necesario integrar innovaciones biomédicas en prevención que se complementen y potencien para el control de la epidemia (2).

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINÚE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 13 de 63

De esta forma se incluyeron 693 hombres, 67% montevideanos y 67% con estudios superiores. El 17% fue forzado a tener relaciones sexuales en algún momento, el 20% fue abusado por su orientación sexual y el 68,4% ocultó su orientación sexual emocional hasta cierto punto. El 57,2% usó preservativo durante el último incidente de sexo anal, lo que representa una disminución en comparación con 2012 (67,6%), mientras que la tendencia de cobertura de la prueba del VIH (66%) fue un aumento en comparación con encuestas anteriores. La tasa de seropositivos fue del 13,3% (2).

Así mismo el análisis multivariado mostró que los factores asociados con la menor probabilidad de uso del condón fueron: pareja estable en el último año, homosexualidad autoidentificada, prueba de VIH en el último año y vacunación contra el virus del papiloma humano. Los más probables de utilizar fueron: Participación en eventos informativos, relaciones sexuales con personas que viven con ITS/VIH (2).

Análisis: Esta tesis nos brinda la oportunidad de poder identificar los comportamientos sexuales de las personas, además de las prácticas de prevención que las personas tienen con el VIH, siendo la población sujeta de estudio los gais y hombres que tienen relaciones con otros hombres. De esta forma haciendo nuestro saber sumamente más detallado, Esta información nos suministra lo que podemos usar para nuestra base y estructura de nuestro trabajo investigativo.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 14 de 63

1.1.2 NACIONAL

Título: Hallazgos en piel en pacientes con infección por VIH en Bogotá

Autores: Tamayo-Buendía Margarita, Chaparro-Reyes Daniela, Charry-Anzola Laura P., Garzón Javier.

Año de publicación: 2022

Ámbito geográfico: Bogotá, Colombia.

Resumen: introducción: De esta forma en Colombia se han realizado estudios e investigaciones con el fin de conocer el nivel de conocimiento que poseen los jóvenes de nuestro país dando como resultado desconocimiento por la mayor parte de los hombres adultos. Además, en la ciudad de Bogotá se realizó un estudio en el cual se evaluó un total de 168 pacientes que, en su mayoría, eran hombres (88,7%), en la cuarta década de la vida, de orientación HSH (77,4%), con foto tipos del II al IV (97%) y manejados con terapia antirretroviral 94,6% (3).

En los cuales se encontraron hallazgos en piel en el 97,6% de los pacientes, siendo más frecuentes las infecciones (43,8%), específicamente los condilomas anogenitales, principalmente en pacientes con <200 linfocitos $CD4^+/mm^3$, seguidas por las condiciones inflamatorias (35,4%), principalmente dermatitis seborreica y acné. Este último, más frecuente en pacientes con >200 linfocitos $CD4^+/mm^3$. Así, los hallazgos cutáneos más comunes fueron: dermatitis seborreica, verrugas anogenitales, verrugas virales, molusco contagioso y micosis superficiales, similares a los reportados en pacientes con buen control inmunobiológico de la enfermedad (3).

Por consiguiente, el 94,6% de los pacientes recibieron terapia antirretroviral durante la evaluación, Tenofovir Emtricitabina Efavirenz (44 pacientes), Emtricitabina Tenofovir Dolutegravir (22 pacientes) y tenofovir, emtricitabina, darunavir, ritonavir (21 pacientes) En cuanto a los paraclínicos, 77 pacientes (45,8%) tenían carga viral de VIH indetectable y la mediana del conteo de linfocitos $CD4^+$ fue de 343 (7 - 1949) (3).

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 15 de 63

Análisis: Este estudio nos brinda la información necesaria para la realización de nuestro trabajo, ya que nos ayuda a determinar cuáles son los pacientes con VIH y se pueden encontrar en todos los problemas con su piel y un índice muy alto de infecciones, como dermatitis seborreica y acné. Este último, más frecuente en pacientes con linfocitos CD4+/mm³, no obstante, estos fueron los más frecuentes, dermatitis seborreica, condilomas anogenitales, verrugas virales, moluscos contagiosos y micosis superficial

Dando como un resultado la importancia y gravedad del VIH y así como la adecuada educación a las personas portadoras del VIH y al resto de personas ya que estas podrían entender la gravedad del virus y como enfrentarse a este, sus síntomas, que tan avanzado se encuentran y como sobrellevar este día a día, no solo físicamente sino mentalmente.

Título: Menosprecio y riesgos en hombres que tienen sexo con hombres viviendo con VIH en Medellín.

Autores: Marín Posada S, Posada Zapata IC.

Año de publicación: 2019

Ámbito geográfico: Medellín, Colombia

Resumen: introducción: Puesto que, en Medellín, la prevalencia de VIH presenta un avance bastante significativo: para 2005 respondía al 0,15% y en 2017 al 0,42% 4; además, las enfermedades relacionadas con el VIH ocuparon el primer lugar como causa de muerte por enfermedad para el grupo de hombres de 15 a 44 años en esta misma ciudad para el año 2017. Adicionalmente, desde que el virus se ha hecho visible en la agenda pública se le ha vinculado con ciertos grupos poblacionales, dentro de los que sobresale el de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH), grupo entre el cual se estima una prevalencia de la infección en Latinoamérica que oscila entre el 5 y el 40%; y para el caso de Medellín se tiene una prevalencia del 20,7% para 2015, dando cuenta de una concentración de la infección por VIH en este grupo poblacional (4).

	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 16 de 63

Así pues, el mismo estudio también reveló cuestiones interesantes relacionadas con el comportamiento sexual de riesgo, como que el 18,5 % de los HSH informaron usar condones solo algunas veces, mientras que el 2,8 % informaron que nunca usaron condones; por otro lado, se evidencia una fuerte discriminación en la vida de los HSH: el 22,2% de los participantes reportaron que sus familias los habían rechazado, estigmatizado o maltratado por su sexualidad, y el 12,1% se mostró preocupado por esta información sobre sus vidas en el historial médico (4). De tal manera que se realizaron once entrevistas las cuales fueron codificadas y analizadas siguiendo el enfoque de teoría fundamentada propuesto por Strauss y Corbin. El muestreo tiene dos elementos, el primero es el muestreo intencional estratificado y el segundo es el muestreo teórico. Participaron del estudio ocho personas mayores de 18 años con VIH y residentes en el área metropolitana de Medellín (4).

Análisis: El presente artículo de la ciudad de Medellín, nos aporta en el proyecto de investigación conocer sobre el menosprecio, por lo cual es un tema que hoy día abunda en distintos lugares de Colombia y el riesgo que pueden manifestarse en los hombres que mantienen relaciones con otros hombres y que de esta manera viven con VIH, es decir, una relación del mismo sexo. Una cantidad mínima de hombres tenían conocimiento del uso del condón. El rechazo y ofensas que estos individuos reciben ante su orientación sexual, generándoles así inseguridades y baja autoestima consigo mismos. Un aporte importante es que debemos mantener el respeto entre nosotros mismo independientemente del género al que nos inclinemos, toda persona tiene el derecho a gozar de su sexualidad como lo desee e igualmente deben tener conocimientos mucho más amplios y claro para que de una u otra manera puedan protegerse ante esta infección.

1.1.3 LOCAL

Título: Utilización de servicios de salud preventivos en hombres con diagnóstico de VIH de una IPS de Cartagena.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINÚE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 17 de 63

Autores: Irma Yolanda Castillo Ávila, Araque Romero Adriana, Barrios Barrios Sifralis, Carbal Vargas Anyi.

Año de publicación: 2019

Ámbito geográfico: Cartagena de indias, Colombia.

Resumen: introducción: Por consiguiente, se realizó una encuesta descriptiva censal en Cartagena con 170 personas diagnosticadas con VIH, mayores de 18 años, atendidas por IPS especializadas, que supieran leer, escribir y aceptaran participar en la investigación. Se utilizaron como instrumentos un cuestionario sociodemográfico y una ficha de utilización de servicios de prevención para evaluar aspectos como la participación en la consejería de programas de prevención y la participación en programas de detección temprana. Así, se tuvieron en cuenta todos los aspectos éticos relacionados con la investigación en salud y el acceso a la información de las personas con VIH. La información obtenida se procesó en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y se utilizó estadística descriptiva (5).

Como resultado, el 85,9% (146 personas) de los participantes del estudio se consideraban heterosexuales con una edad media de 41,8 años (DE=13,1), y el 85,3% (145 personas) visitaban al médico más de 4 veces al año. Principalmente el 90% (153) de manera regular, solo el 11,8% (20) de los participantes participaron en programas de promoción y prevención, la mayoría porque ya tenían otra patología de base, como hipertensión arterial 7,1% (12) o diabetes 2,9% (5) utilizan anticonceptivos, sólo el 72,4% (123) indicaron que utilizan preservativo (5).

De esta forma teniendo como conclusión que, los hombres infectados por el VIH asistían a consultas médicas periódicas, aunque la mayoría de ellos desconocía la importancia de los programas de salud preventiva y no participaba en ellos. Quienes participaron en el programa de control lo hicieron principalmente porque padecían enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión arterial (5).

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 18 de 63

Análisis: Este artículo es de forma concisa y clara el trabajo realizado por la universidad de Cartagena nos aporta mucho, ya que tiene el objetivo principal frente a las prácticas y prevenciones de esta enfermedad. La información es muy sustanciosa ya que nos permite ampliar conocimiento sobre el manejo de esta enfermedad en nuestra ciudad, aportando también a la población sujeto de estudio conocimiento sobre el tema y que precauciones se pueden tomar ante la aparición de ellas, y también como y de qué manera podemos prevenirlas. Luego de realizar el análisis podemos concluir que. Los hombres que conviven con VIH, asisten a consultas médicas rutinarias, aunque en su mayoría no tienen conocimiento de la importancia de los programas preventivos en salud y no están inscritos a ellos. Quienes asisten a algún programa de control, lo hacen en su mayoría porque tienen una patología crónica, tipo diabetes o hipertensión de base.

Título: Prevalencia de resistencia a la terapia antirretroviral en pacientes con VIH en la ciudad de Cartagena, Colombia.

Autores: Caraballo Gómez Cáceres, Pedro José.

Año de publicación: 2020

Ámbito geográfico: Cartagena de indias, Colombia.

Resumen: introducción: Por ultimo y no menos importante, se realizó un estudio transversal retrospectivo para determinar la prevalencia de resistencia a TARV en pacientes diagnosticados de VIH y sus mutaciones asociadas mediante el análisis de los genotipos de las mutaciones identificadas. De tal manera que 682 pacientes fueron incluidos en el estudio. La edad promedio de los pacientes incluidos fueron 39 años, 30 años p25 y 49 años p75. El 58,4% de los pacientes incluidos eran mujeres, y los 41,5% restantes son hombres (6).

Dando este estudio como resultado que las tasas de resistencia a antirretrovirales en Cartagena en mínimos hasta el 10% asignado a Colombia por la Organización Mundial de la Salud. La mutación más común que confiere resistencia a los NTRI seguidos de los NNTRI y La tasa de resistencia a IP fue inferior al 1%. Se necesita

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 19 de 63

hacer más estudios, especialmente estudios prospectivos, para determinar la prevalencia de la farmacorresistencia. Para pacientes que no han estado expuestos previamente a medicamentos antirretrovirales o estudios filogenéticos de dispersión (6).

Análisis: El presente estudio nos aporta en la interpretación de los pacientes con diagnóstico de VIH y las mutaciones asociadas en el análisis genotípico de las mutaciones encontradas, por tanto es de mucho beneficio esta información, ay que nos construye con muchos saberes frente a la enfermedad, para intervenir con prácticas preventivas

1.2 MARCO TEÓRICO

1.2.1 VIH SIDA

1.2.2 DEFINICIÓN

La infección por el VIH es un proceso crónico irreversible, que se asocia a un riesgo aumentado de diversos problemas de salud. El VIH es un retrovirus, cuya infección en los seres humanos provoca un cuadro clínico sindrómico de evolución prolongada, que, al alcanzar su fase final provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida: SIDA (7). Por otra parte, según la organización mundial de la salud (OMS), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4 (8). De esta forma la infección causada por el VIH se caracteriza por producir una lenta, pero continua destrucción del sistema inmune al destruir los linfocitos. Es decir, que este virus, se encuentra con capacidad infectiva en los fluidos humanos tales

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 20 de 63

como sangre, semen y secreciones cérvico-vaginales. Por tanto, las prácticas de riesgo estarán en relación con la puesta en contacto de uno de estos fluidos infectados, como una puerta de entrada del huésped (7).

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la existencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres involucrados con el VIH (9).

1.2.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL VIH/SIDA

Los síntomas de la infección por el VIH varían según la etapa de que se encuentre la enfermedad. En los primeros meses es cuando se produce el pico más alto de infección, muchas personas desconocen que son portadores hasta fases más avanzadas. En algunos casos durante las primeras semanas que continua al contagio la persona es asintomática y en otras circunstancias muestra un cuadroseudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta. A medida que la infección va suprimiendo el sistema inmunitario, la persona puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento pueden aparecer enfermedades graves como tuberculosis (TB), meningitis criptocócica, infecciones bacterianas graves o cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi (9).

1.2.4 TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA

El VIH puede transmitirse a través de diferentes modos de transmisión como lo son factores relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada a través de los fluidos corporales (sangre, semen, secreciones vaginales), la leche materna de las mujeres infectadas por VIH contiene altas cantidades del virus. La transmisión se puede dar cuando el virus llega hasta la sangre de otra persona, la cual puede ser a través de heridas o cuando alguno de esos fluidos entra en contacto directo con mucosas corporales (vaginal, anal,

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 21 de 63

conjuntival, oral), a pesar de que estas no presenten lesiones. Ahora bien, la transmisión de madre a hijo del VIH-1 ocurre intrauterina, intraparto o a través de la lactancia, aunque se cree que la mayor parte de la transmisión perinatal ocurre después de la exposición al nacimiento (9).

1.2.5 Factores de Riesgo del VIH/SIDA

Existen conductas y afecciones que aumentan el riesgo de un individuo de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana como es: Tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo, padecer otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana; compartir agujas, jeringuillas, soluciones de droga u otro material de inyección contaminado para consumir drogas inyectables; recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad o ser parte de procedimientos médicos que requieren cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado, pincharse accidentalmente con una aguja de la jeringa, algo que afecta en particular al personal de salud y conocimientos inadecuados o deficientes frente a la infección (9).

La penetración anal es común durante las relaciones sexuales masculinas si los participantes están infectados con el VIH y el condón no se usa, los participantes receptores están muy expuestos a la contracción del VIH este riesgo es mucho mayor que el de las mujeres que tienen relaciones sexuales vaginales sin protección debido a que el recto es delgado y se puede desgarrar fácilmente e incluso la lesión más pequeña es suficiente para facilitar el acceso al virus (10).

1.2.6 PRÁCTICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Práctica. Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos; ejercicio de cualquier arte o facultad. También es definida como el uso continuo, costumbre o estilo de una cosa. Así mismo, podríamos agregar que el conocimiento podría hacer que los individuos modifiquen su modo de ser, pensar,

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 22 de 63

los hábitos y costumbres y que tengan mayor interés en asumir medidas preventivas para identificar tempranamente las enfermedades (11).

1.2.6.1 Práctica de medidas preventivas para evitar contraer el VIH/SIDA.

No existe hasta el momento una vacuna para tratar el VIH/SIDA, por lo que la práctica de medidas preventivas es el único medio de lucha contra la infección por el VIH y la única posibilidad real de controlar esta epidemia. Entre las medidas preventivas que se deben poner en práctica, se consideran las siguientes (11).

1.2.6.2 Uso correcto del preservativo.

El condón masculino o preservativo, es una bolsa de látex delgado, con la que se cubre el pene y evita el contacto de los fluidos vaginales o seminales con el cuerpo de la pareja durante las relaciones sexuales. El condón es el único método que brinda doble protección: evita los embarazos y protege de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (11).

1.2.6.3 Abstinencia de las relaciones sexuales.

La abstinencia sexual consiste en no mantener relaciones sexuales. Una persona que decide practicar la abstinencia sexual ha decidido no mantener relaciones sexuales o ningún tipo de contacto sexual íntimo. Sola la abstinencia sexual completa y constante puede prevenir por completo las ITS, VIH (11).

1.2.6.4 Fidelidad con la pareja.

La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respeto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Por esta razón, la OMS recomienda que los integrantes de una pareja se hagan juntos el examen para detectar el VIH, así como también reciban asesoramiento (11).

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 23 de 63

1.2.6.5 Posponer las relaciones sexuales.

El retraso en el inicio de las relaciones sexuales y el uso del condón siempre una vez iniciadas son las dos recomendaciones para que los jóvenes no se expongan tanto al contagio del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) como a otras enfermedades de transmisión sexual (ITS) y los embarazos no deseados (11).

1.2.6.6 Evitar el uso de jeringas contaminadas.

No se inyecte drogas, pero si lo hace, utilice solamente equipo de inyección esterilizados y nunca comparta su equipo con otras personas (11).

1.2.6.7 Evitar recibir transfusiones sanguíneas de donantes dudosos.

Las transfusiones de sangre permiten salvar vidas y mejorar la salud, pero muchos pacientes que las necesitan no pueden acceder a tiempo a transfusiones seguras. Una base estable de donantes regulares, voluntarios y no remunerados permite garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre no contaminada (11).

1.2.7 TRATAMIENTO

El tratamiento ARV (antirretroviral) es recomendado para todas aquellas personas que viven con VIH, independientemente de la cuenta de células CD4 + y de la presencia o no de síntomas, con el fin de reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y prevenir la transmisión del VIH (12).

Para iniciar el tratamiento ARV se recomienda explicar a cada paciente que vive con VIH los beneficios clínicos de comenzar el tratamiento y de que, el hecho de reducir la actividad viral mediante la farmacoterapia puede reducir el riesgo de transmitir el VIH a otras personas, así mismo si la infección no es tratada es posible que se llegue a producir un desgaste progresivo y, en ocasiones irreversible provocando en un futuro enfermedades y muerte (12).

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 24 de 63

La terapia antirretroviral (TAR) es el tratamiento de las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con fármacos anti-VIH. El tratamiento consiste en una combinación de fármacos (comúnmente llamada "terapia antirretroviral de gran actividad" o TARGA) que suprime la replicación del VIH. Se utiliza una combinación de fármacos para aumentar la potencia y reducir la probabilidad de desarrollar resistencia, este reduce la mortalidad y morbilidad entre las personas infectadas por el VIH, y mejora su calidad de vida. También incluye beneficios a la salud como la prevención de contagio de VIH mediante la supresión de la replicación del virus en personas que viven con el VIH (13).

En base a esto, los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se replique, lo que reduce la concentración del VIH en el cuerpo (llamada la carga viral). Al tener menos concentración del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario tiene más posibilidad de recuperarse y de producir más linfocitos CD4. Aun cuando quede todavía algo del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH (14).

VIH

CAUSA

SIDA

RECHAZO

SOCIAL

FRECUENTE

SINT

**SISTEMA INMUNE
DEBIL**

- PROBLEMAS RESPIRATORIOS

- PROBLEMAS CUTANEOS

DETERIORIO

SALUD

CONTAGIA POR:

CONTACTO SEXUAL

**TRANFUSIONES
SANGUINEAS**

MADRE AL HIJO

	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 26 de 63

MARCO CONCEPTUAL

Hombre: Al decir “hombre” se alude al ejemplar de la especie humana de sexo masculino, también llamado varón o, desde un punto de vista biológico, macho. Es también empleado para diferenciar al varón que ha alcanzado la edad adulta de los ejemplares más jóvenes. Según la biología, el hombre hace parte del reino animalia, es un mamífero bípedo del orden de los primates y de la familia de los homínidos, cuya especie se denomina homo sapiens, que en latín traduce ‘hombre sabio’, lo cual señala una de las características se diferencia de otros ya que es un ser racional, que tiene la capacidad de pensar y reflexionar, posee una serie de capacidades mentales, así como concebir, transmitir y aprender ideas abstractas. (22)

VIH: Según la OMS, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa del organismo, infecta los linfocitos T CD4 del sistema inmunitario, que ayudan al organismo a luchar contra las infecciones. El virus se multiplica dentro de esas células y acaba dañándolas y destruyéndolas. Sin un tratamiento eficaz de una combinación de medicamentos antirretrovíricos, el sistema inmunitario se debilitará hasta el punto de que ya no podrá combatir infecciones ni enfermedades. (23)

Sida: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la etapa más avanzada de la infección por el VIH. Para que se le emita un diagnóstico de sida, una persona con el VIH debe tener una afección característica del sida o un recuento de linfocitos cd4 inferior a 200/mm³ (independientemente de que tenga una afección característica del sida). (24)

Percepción: La percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTÍNE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 27 de 63

bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción. (25)

Transmisión sexual: Según la OMS, las infecciones de transmisión sexual (ITS) se propagan predominantemente por contacto sexual sin protección. Algunas ITS también se pueden transmitir durante el embarazo y el parto y por medio de sangre o productos sanguíneos infectados. Estas tienen repercusiones graves en la salud si no se tratan como enfermedades neurológicas y cardiovasculares, infertilidad, embarazo ectópico, muerte prenatal y riesgo aumentado de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Además, las ITS guardan relación con la estigmatización y la violencia doméstica, y afectan a la calidad de vida. (26)

Salud: Según la organización mundial de la salud (OMS), el concepto de salud está vinculado a un estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo a la ausencia de enfermedades. Es el estado general de un organismo vivo, en tanto ejecuta sus funciones vitales de una forma eficiente, lo cual le permite desenvolverse adecuadamente en su entorno. A la salud también se define en dos niveles: un nivel subjetivo (el sujeto cree que está en bienestar) y un nivel objetivo (cuando existen datos que permiten verificar dicho estado). (27)

Riesgo: Es la vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. Por otra parte, es suceso de peligro inminente pueda tomar efecto en algún lugar determinado y llegar a perjudicar a uno o más individuos; esto quiere decir, que mide qué tan vulnerable es el entorno y los individuos en el mismo. (28)

Enfermedad: Se considera enfermedad cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno. Incluso cuando la causa se desconoce, casi siempre se puede explicar una enfermedad en términos de los procesos fisiológicos o mentales que se alteran.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINÚE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 28 de 63

Se le considerar desde dos concepciones: una subjetiva, que es el malestar (sentirse mal con diferente intensidad), y otra objetiva, que es la que afecta a la capacidad de funcionar (limitación del funcionamiento corporal en diferentes grados). (29)

Morbilidad: El instituto nacional del cáncer lo refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de una enfermedad, o a la proporción de enfermedad en una población. La morbilidad también se refiere a los problemas médicos que produce un tratamiento. (30)

Por otra parte, La Organización Mundial de la Salud la define como “toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar”. Morbilidad es el índice de personas enfermas en un lugar y tiempo determinado. El índice o la tasa de morbilidad es un dato estadístico útil para estudiar los procesos de evolución y control de las enfermedades. (31)

Mortalidad: Nos referimos a mortalidad a las muertes sucedidas dentro de una población. Si bien todos estamos destinados a morir algún día, la probabilidad de morir durante un período determinado de tiempo se relaciona con muchos factores, como la edad, el sexo, la raza, la ocupación y la clase social. La incidencia de muerte puede revelar muchos detalles acerca del nivel de vida y la atención médica dentro de una población (32).

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 29 de 63

METODOLOGIA

NATURALEZA DE LA INVESTIGACION

El presente proyecto se fundamenta bajo la naturaleza cuantitativa pues los procesos que en él se desarrollan se basan en la recolección y el procesamiento de datos cuantificables sobre una variable determinada en la población, estos datos son analizados mediante herramientas estadísticas y expresados en cifras numéricas, medibles, para garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados respecto al comportamiento de la muestra sometida a la investigación. [33]

TIPO DE ESTUDIO

Descriptivo

Debido a que se limita a evaluar la percepción del riesgo en hombres de la localidad 2 de Cartagena, y no se realiza intervención alguna por parte del equipo investigador, sino que la mediación de los investigadores es netamente observacional.

Transversal

Dado que se analiza una variable que permanece constante en un periodo de tiempo con límites previamente establecidos, sobre un subconjunto muestral definido, es decir la información requerida se recopila durante un periodo de tiempo y se analiza su interacción en un corto tiempo de ejecución y finalmente se expresan los resultados. [33]

POBLACION Y MUESTRA

Población

352.780 hombres de la localidad 2 residentes en Cartagena de indias.

Muestra

Comprendió 408 Hombres de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINÚE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 30 de 63

Tipo de muestreo

Corresponde a un tipo de muestreo por conveniencia ya que es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio que se utiliza para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, en un lapso de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular donde se encuestarán los hombres residentes de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena. [34]

Criterios de inclusión

- Hombres residan en la localidad 2 de Cartagena de indias.
- Hombres que acepten firmar el consentimiento.
- Hombres que sean mayores de 18 años de edad.

Criterios de exclusión

- Hombres que no acepten firmar el consentimiento.
- Hombres que no residan en la localidad 2 en Cartagena de indias.
- Hombres que no sean menores de 18 años de edad.

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS

Primaria

- Encuestas realizadas a hombres residentes en la localidad 2 de la ciudad de Cartagena.

Secundarias

- Artículos de revistas científicas, libros, informes, manuales y guías en las que se analizan aspectos relacionados con la percepción del VIH en hombres.

INSTRUMENTO

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 31 de 63

El instrumento aplicado en esta investigación de la autora Bach. Marleny Castillo Tafurestará, que está compuesto por los siguientes aspectos:

1. Aspectos sociodemográficos de los hombres: aquí se indaga con respecto a variables tales como edad y sexo.
2. Conocimiento que tiene los hombres sobre el riesgo de la infección del VIH: Se recurrió a un instrumento que corresponde a una encuesta en la cual se realizaron 30 preguntas de conocimiento.
3. Percepción que tiene los hombres sobre el riesgo de la infección del VIH: Se recurrió a un instrumento que corresponde a una encuesta en la cual se realizaron 35 preguntas de percepción [35].

RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

La información será recolectada mediante la aplicación de un cuestionario físico en la localidad 2 de la ciudad de Cartagena, se realizarán la divulgación de las encuestas en el lugar destinado para la recolección de la información y se captará a la mayoría de los hombres posibles mediante el diligenciamiento del instrumento. Cuando se haya diligenciado una cantidad de encuestas equivalente al tamaño de la muestra se detendrá la recolección. Posteriormente se iniciará el proceso de digitación de los formularios en una base de datos en Excel con la cual se conformará la matriz de tabulación, posteriormente se dará paso al procedimiento de análisis de los datos y finalmente se elaborarán las conclusiones de acuerdo a los resultados y se cerrará la investigación.

ANALISIS DE LA INFORMACION

Se realizará con el uso de las estadísticas descriptivas, tales como medidas de tendencia central (media, moda, mediana), también se recurrirá al cálculo de porcentajes, razones y proporciones, la matriz de datos en Excel será clave para el desarrollo de este punto, permitiendo analizar el comportamiento de la variable en estudio de acuerdo a las respuestas obtenidas en la aplicación del cuestionario

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 32 de 63

sobre conocimiento y percepción del riesgo sobre infección por VIH en hombres de la localidad 2 de Cartagena.

PRESENTACION DE LOS DATOS

Los datos se presentarán en tablas simples, gráficas de barras, de pastel, entre otras, en cuanto la forma de medida de la variable (nominal, ordinal y razón) lo permita. Así mismo, se darán a conocer las respectivas descripciones y análisis de los datos a manera de texto. Con posterioridad dichos resultados serán objeto de discusión, para lo cual se compararán con hallazgos de otros estudios, de este modo se contextualizarán y comentarán.

DIVULGACION DE LA INFORMACION

Se llevará a cabo el día de la sustentación y presentación del PAT Colectivo institucional en el cual se efectuará una presentación en diapositivas, acompañada de una ponencia. Sumado a esto, los resultados de esta investigación serán divulgados en congresos y seminarios nacionales de investigación por parte de los estudiantes semilleristas del programa de enfermería.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 33 de 63

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El proyecto de investigación se enmarca en la Resolución 8430 de 1993, la cual permite clasificarla como una investigación sin riesgo, pues concuerda con el hecho de ser un estudio que emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes. Además, las investigaciones con seres humanos, la investigación en comunidades y los aspectos necesarios para la elaboración del consentimiento informado, la clasificación del riesgo y los compromisos que adquieren los investigadores se reglamentan por la resolución mencionada, por la cual se establecen las normas académicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Cabe mencionar, que, al momento de recolectar la información, se hará firmar el respectivo consentimiento informado [36].

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 34 de 63

RESULTADOS

GRAFICA 1.

Titulo del gráfico: Percepción general del riesgo por VIH



Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 1.

Categoría	Puntaje
Alta	280
Baja	12
Media	116
Total general	408


ANALISIS: El estudio realizado incluyó una participación de 408 hombres los cuales respondieron de acuerdo a la percepción general que tiene la población, frente al riesgo de la enfermedad VIH/SIDA, por lo tanto, en un rango alto, 208

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 35 de 63

hombres abarcan una percepción del riesgo, a diferencia de un total de 12 considerado nivel bajo, sin embargo, el nivel de rango medio apunto con 116 contribuyendo sobre la temática mencionada en lo anterior.

1. COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICOS

GRAFICA 2. EDAD DE LOS HOMBRES



Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 2: EDAD

ITEMS	FRECUENCIA N° PERSONAS	FRECUENCIA %
18-30 años	358	88%
31-40 años	21	5,2%
41-50 años	18	4,4%
51-60 años	5	1,2%
60 y mas	5	1,2%
TOTAL DE ENCUESTADOS	407	100%


ANALISIS: De acuerdo a la gráfica 1, como resultado frente al componente sociodemográfico, en las edades, se evidencio una participación de hombres con un intervalo de 18 a 30 años y mayores de 60, los cuales, fueron encuestados

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 36 de 63

frente la percepción de riesgo que tienen sobre la infección por VIH con un 1,2% respectivamente, mientras que la población de 18 - 30 años con un 87,9%.

2. COMPONENTE PERCEPCIÓN DE RIESGO SOBRE LA INFECCIÓN POR VIH EN HOMBRES

GRAFICA 3. ¿LAS TRAJADORAS SEXUALES TIENEN ALTO RIESGO DE CONTRAER VIH/SIDA?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

ANALISIS: En la población encuestada se mostró que el 82,2% de los hombres entrevistados, consideran que todas las trabajadoras sexuales tienen un alto riesgo de poder contraer VIH/SIDA, mientras que el 7,9% está en desacuerdo frente a esta situación, sin embargo, un 10,1% no opina frente a la problemática.

TABLA 3. ¿LAS TRAJADORAS SEXUALES TIENEN ALTO RIESGO DE CONTRAER VIH/SIDA?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	334	82,2%
EN DESACUERDO	32	7,9%
NO OPINA	41	10,1%
TOTAL DE ENCUESTADOS	407	1,002%

GRAFICA 4. ¿CREE USTED QUE EL VIH SE PUEDE CONTRAER COMPARTIENDO CUCHILLOS, TENEDORES O VASOS CON UNA PERSONA INFECTADA?



ANALISIS: Del total de los encuestados en la gráfica 3, se refleja que el 28,6%, de los hombres, reconocen que el VIH se puede contraer v al compartir cuchillos, tenedores o vasos con una persona infectada, por otro lado el 56,2% está en desacuerdo y un 15,2% no opina, los resultados se muestran en la gráfica.


Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 4: ¿CREE USTED QUE EL VIH SE PUEDE CONTRAER COMPARTIENDO CUCHILLOS, TENEDORES O VASOS CON UNA PERSONA INFECTADA?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	117	28,6%
EN DESACUERDO	230	56,2%
NO OPINA	62	15,2%
TOTAL DE ENCUESTADOS	409	100%

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 38 de 63

GRAFICA 5. ¿ESTA CONVENCIDO QUE LOS HOMBRES CON VIH PUEDEN INFECTAR MUJERES?



Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres


TABLA 5 ¿ESTA CONVENCIDO QUE LOS HOMBRES CON VIH PUEDEN INFECTAR MUJERES?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	366	89,7%
EN DESACUERDO	22	5,4%
NO OPINA	20	4,9%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	100%

ANALISIS: Es evidente que el 89,7%, de los encuestados respondió que los hombres con VIH pueden infectar a mujeres, igualmente se preguntó a la población que si estaba en desacuerdo y como resultado se obtuvo un 5,4% frente a esta situación, sin embargo un 4,9% no opina.

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 39 de 63

GRAFICA 6. ¿EFECTIVAMENTE, EL VIH ES UNA ENFERMEDAD QUE AMENAZA LA VIDA DE LAS PERSONAS?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 6: ¿EFECTIVAMENTE, EL VIH ES UNA ENFERMEDAD QUE AMENAZA LA VIDA DE LAS PERSONAS?		
ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	360	88,2%
EN DESACUERDO	26	6,4%
NO OPINA	22	5,4%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	100%

ANALISIS: Es evidente que el 88,2% de la población, considera que el VIH es efectivamente una enfermedad que amenaza la vida de las personas, mientras que el 6,4% está en desacuerdo frente a la problemática.

GRAFICA 7. ¿CREE USTED QUE RECIBIR UNA TRANFUSION DE SANGRE INFECTADA, PUEDE TRASMITIRLE A UNA PERSONA EL VIH?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 7: ¿CREE USTED QUE RECIBIR UNA TRANFUSION DE SANGRE INFECTADA, PUEDE TRASMITIRLE A UNA PERSONA EL VIH?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	366	89,7%
EN DESACUERDO	15	3,7
NO OPINA	27	6,6%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	100%

ANALISIS: En la población encuestada se determinó que, el 89,7%, piensa que recibir una trasfusión de sangre infectada puede transmitirle el VIH a una persona, sin embargo, el 3,7% está en desacuerdo con lo dicho anteriormente.

GRAFICA 8. ¿PUEDEN INFECTAR LOS HOMBRES CON VIH A LAS MUJERES?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	355	87%
EN DESACUERDO	18	4,4%
NO OPINA	35	8,6%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	100%

ANALISIS: Se reflejó que el 87% de los hombres con VIH pueden infectar a las mujeres, a diferencia del, 4,4% que está en desacuerdo con la problemática mencionada.

GRAFICA 9. ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS CONTAGIADAS DE VIH, ESTAN PROPENSAS A CONTRAER OTRAS ENFERMEDADES?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 9: ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS CONTAGIADAS DE VIH, ESTAN PROPENSAS A CONTRAER OTRAS ENFERMEDADES?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA	Nº PERS	
DE ACUERDO	304	74,5%
EN DESACUERDO	38	9,3%
NO OPINA	66	16,2%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	100%

ANALISIS: En la grafica 8 se evidencia que, el 74,5% considera que todas las personas contagiadas de VIH, estan propensas a contraer otras enfermedades, a diferencia del 9,3% que esta en desacuerdo según lo cuestionado.

GRAFICA 10. ¿ES POSIBLE QUE LA PERSONA INFECTADA, NO PRESENTE NINGUN SINTOMA DE LA ENFERMEDAD?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 10: ¿ES POSIBLE QUE LA PERSONA INFECTADA, NO PRESENTE NINGUN SINTOMA DE LA ENFERMEDAD?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	293	71,8%
EN DESACUERDO	52	12,7%
NO OPINA	63	15,4%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	99,9%

ANALISIS: En la encuesta se deduce que, el 71,8% considera que existe la posibilidad de que una persona se encuentre infectada y no manifieste ningún síntoma, a diferencia del, el 12,7% que se encuentra en desacuerdo.

GRAFICA 11. ¿CREE USTED QUE EL VIRUS DEL VIH DEBILITA LA CAPACIDAD DEL CUERPO PARA COMBATIR LAS INFECCIONES?



Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 11: ¿ES POSIBLE QUE LA PERSONA INFECTADA, NO PRESENTE NINGUN SINTOMA DE LA ENFERMEDAD?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	323	79,2%
EN DESACUERDO	31	7,6%
NO OPINA	54	13,2%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	100%

ANALISIS: En la grafica 10 se determina que, el 79,2% medita, que el virus del VIH debilita la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones, por tanto, el 7,6% esta en desacuerdo frente a lo mencionado anteriormente.

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 45 de 63

GRAFICA 12. ¿CREE USTED QUE EXISTE UN TRATAMIENTO MEDICO QUE PUEDA PREVENIR EL VIH?





TABLA12: ¿CREE USTED QUE EXISTE UN TRATAMIENTO MEDICO QUE PUEDA PREVENIR EL VIH?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	191	46,8%
EN DESACUERDO	130	31,9%
NO OPINA	87	1,3%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	80%

ANALISIS: En la gráfica 11 se establece que el 46,8% estima que existe esa probabilidad de un tratamiento médico que pueda prevenir el VIH, en comparación con el 31,9% que se encuentra en desacuerdo.

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTINÚE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 46 de 63

GRAFICA 13. ¿CREE USTED QUE EL VIRUS PUEDE TRASMITIRSE ENTRE DOS HOMBRES QUE TENGAN RELACIONES SEXUALES?



Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres


TABLA13: ¿CREE USTED QUE EL VIRUS PUEDE TRASMITIRSE ENTRE DOS HOMBRES QUE TENGAN RELACIONES SEXUALES?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	311	76,2%
EN DESACUERDO	41	10%
NO OPINA	56	13,7%
TOTAL DE ENCUESTADOS	408	99,9%

ANALISIS: De acuerdo a la gráfica 12 se muestra que, el 76,2% concibe que el virus puede transmitirse entre dos hombres que tengan relaciones sexuales, de modo que, el 10% está en desacuerdo frente a la interrogante mencionada anteriormente.

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTINÚE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 47 de 63

GRAFICA 14. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE USAR CONDONES AL MOMENTO DE TENER RELACIONES SEXUALES?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 14: ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE USAR CONDONES AL MOMENTO DE TENER RELACIONES SEXUALES?		
ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	339	82,9%
EN DESACUERDO	30	7,3%
NO OPINA	40	9,8%
TOTAL DE ENCUESTADOS	409	100%

ANALISIS: Se observa en la grafica 13 que el 82,9%, manifiesta que es importante usar condones al momento de tener relaciones sexuales, en cambio, el 7,3% esta en desacuerdo frente a la utilizacion de los metodos al momento de tener conexión.

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 48 de 63

GRAFICA 15. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN SOBRE LA ENFERMEDAD (VIH) EN CLASES DE COMPORTAMIENTO Y SALUD?



Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres


TABLA 15: ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN SOBRE LA ENFERMEDAD (VIH) EN CLASES DE COMPORTAMIENTO Y SALUD?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	366	89,5%
EN DESACUERDO	14	3,4%
NO OPINA	29	7,1%
TOTAL DE ENCUESTADOS	409	100%

ANALISIS: En los resultados de la gráfica 14, se mostró que el 89,5%, estima que los estudiantes tienen que aprender sobre la enfermedad de VIH en clases de comportamiento y salud, en cambio, los hombres que están en desacuerdo, prevalecen un efecto del 3,4% de la problemática mencionada en lo anterior.

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ <small>PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</small>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 49 de 63

GRAFICA 16. ¿PUEDO CONTRAER EL SIDA A TRAVES DE ALGUIEN QUE ESTE INFECTADO, AUNQUE NO MANIFIESTE SINTOMAS?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 16 ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN SOBRE LA ENFERMEDAD (VIH) EN CLASES DE COMPORTAMIENTO Y SALUD?

ITEMS	FRECUENCIA N°	FRECUENCIA%
DE ACUERDO	312	76,3%
EN DESACUERDO	40	9,8%
NO OPINA	57	13,9%
TOTAL DE ENCUESTADOS	409	100%

ANALISIS: El 76,3%, piensa que el sida se contrae a través de alguien que este infectado, aunque no manifieste signos y síntomas, a diferencia del 9,8%, el cual está en desacuerdo con lo dicho anteriormente.

GRAFICA 17. ¿CREE USTED QUE EL VIRUS DEL SIDA SE TRASMITE A TRAVES DEL SEMEN?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

GRAFICA 17. ¿CREE USTED QUE EL VIRUS DEL SIDA SE TRASMITE A TRAVES DEL SEMEN?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	315	77%
EN DESACUERDO	44	10,8%
NO OPINA	50	12,2%
TOTAL DE ENCUESTADOS	409	100%

ANALISIS: En la gráfica 16 mostramos que el 77%, respondió asertivamente que el virus del sida se trasmite a través del semen, mientras que, existe un 10,8% que está en desacuerdo con esta información.

GRAFICA 18. ¿CRRE USTED QUE LAS PERSONAS PUEDEN REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LLEGAR A INFECTARSE CON EL VIRUS DEL VIH/SIDA EVITANDO LAS RELACIONES SEXUALES?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 18: . ¿CRRE USTED QUE LAS PERSONAS PUEDEN REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LLEGAR A INFECTARSE CON EL VIRUS DEL VIH/SIDA EVITANDO LAS RELACIONES SEXUALES?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	249	60,9%
EN DESACUERDO	122	29,8%
NO OPINA	38	9,3%
TOTAL DE ENCUESTADOS	409	100%

ANALISIS: Al analizar los resultados de esta gráfica, observamos que, el 60,9%, considera que las personas pueden reducir la probabilidad de llegar a infectarse con el virus del VIH/SIDA evitando las relaciones sexuales, a diferencia del, 29,8% que este desacuerdo frente a la problemática.

GRAFICA 19. ¿ES POSIBLE QUE, EN LA ACTUALIDAD, NO EXISTA UNA CURA CONOCIDA PARA EL VIH/SIDA?




Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 19: . ¿ES POSIBLE QUE EN LA ACTUALIDAD, NO EXISTA UNA CURA CONOCIDA PARA EL VIH/SIDA?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA N° PERS		
DE ACUERDO	254	62,1%
EN DESACUERDO	88	21,5%
NO OPINA	67	16,4%
TOTAL DE ENCUESTADOS	409	100%

ANALISIS: En esta gráfica se demuestra que el 62,1% deduce que en la actualidad no es posible que exista una cura para combatir el VIH/SIDA, sin embargo un 21,5% se encuentra en desacuerdo con lo anterior.

GRAFICA 20. ¿CREE USTED QUE TODAS LAS PERSONAS CON EL VIRUS SON HOMOSEXUALES?



Fuente: Datos arrojados por la encuesta percepción de riesgo sobre la infección por VIH en hombres

TABLA 20: ¿CREE USTED QUE TODAS LAS PERSONAS CON EL VIRUS SON HOMOSEXUALES?

ITEMS		FRECUENCIA%
FRECUENCIA	Nº PERS	
DE ACUERDO	34	8,3%
EN DESACUERDO	331	80,9%
NO OPINA	44	10,8%
TOTAL DE ENCUESTADOS	409	100%

ANALISIS: En el estudio, se observa que prevalece un 80,9% de los encuestados los cuales consideran que están en desacuerdo en que las personas que carecen del virus VIH/SIDA son homosexuales, a diferencia del 8,3%, las cuales están de acuerdo que esta afección se presente más en este género.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 54 de 63

DISCUSIÓN

La presente investigación aportó información detallada sobre la percepción de riesgo de la enfermedad por VIH. Se encontró que la edad que más predomina es de 18-30 años con el 89,9%, similar al estudio de Pérez Calderón y sus colaboradores donde en su investigación de nivel de conocimientos, actitudes y percepciones frente al VIH/SIDA en varones, muestra que el promedio de edad entre los encuestados de 29 años [38].

En relación al nivel de percepción del riesgo, se pudo evidenciar que con el nivel de percepción que tienen los hombres acerca del riesgo de contraer VIH es alta, a causa de que los resultados de la muestra arrojaron que el 68,6%, tuvieron un puntaje de (153 – 195) al momento de responder la encuesta, encontrando diferencia con Cadenillas H, Lariza Y, donde 66,3% tiene un nivel de conocimiento medio según los resultados de su investigación de [39].

Respecto a la percepción en esta investigación el 82,2%, considera que las trabajadoras sexuales tienen un alto riesgo de contraer dicha enfermedad, se relaciona con el estudio de Pérez Calderón y sus colaboradores donde se determinó que el 74% reconoció que los hombres que tiene relaciones sexuales con los de su mismo género tienen un elevado riesgo de contraer VIH/SIDA [35]. Así mismo el 82,9% considera que es importante el uso del condón al momento de tener relaciones sexuales para la prevención del VIH; mostrando similitud con la investigación realizada por Pérez y Espejo en la cual se detectó que el 89% de los varones del estudio consideran que es muy importante usar condones cada vez que se tenga relaciones sexuales. Se conocieron diferencias en cuanto el artículo de Cabrera Susana acerca del comportamiento sexual y prácticas de prevención del virus de inmunodeficiencia humana en varones y hombres que tienen sexo con hombres. Se evidencia que el 34,5% considera que es importante usar condones al momento de tener relaciones sexuales [37].

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
			Fecha	30/09/2022
			Página	Página 55 de 63

En este contexto, este estudio permitió generar un abordaje teórico acorde con las implicaciones esenciales de los hombres como grupo poblacional, logrando así el objetivo de determinar el nivel de percepción del riesgo de contraer el virus. Para finalizar, se denota que teniendo como referencia los resultados de los diferentes artículos en discusión podemos decir que en la población masculina hay una alta prevalencia en cuanto a la percepción del riesgo de contraer VIH-sida, conocen a cerca de los métodos de barrera que permiten evitar su contagio y propagación. Sin embargo, es importante aclarar que aún se sigue considerando un tabú el uso del preservativo, y que el accionar del profesional de enfermería en cuanto a la educación en salud es crucial en este contexto.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 56 de 63

CONCLUSION

Con la investigación llevada a cabo fue posible determinar la percepción del riesgo sobre infección por VIH en hombres de la localidad 2 de Cartagena. En cuanto a esto se puede afirmar que el objetivo originalmente planteado fue satisfecho cabalmente.

Ahora bien, de lo anterior se efectuó –en principio– la caracterización sociodemográfica de los hombres residentes de la localidad 2, así se pudo concluir que se trató de hombres entre 18 a 30 años en su gran mayoría, que profesan la religión católica y de residencia en la zona urbana.

Con respecto al nivel de percepción sobre VIH, se pudo establecer que los hombres de la localidad 2 presentan un nivel alto. Alguno de los aspectos más relevantes estuvo asociados a la percepción de que los hombres pueden infectar a las mujeres con este virus, considerando que efectivamente la enfermedad de VIH amenaza con la vida de las personas, así mismo, piensan que existe un tratamiento médico que puede prevenir el VIH y manifiestan que es importante usar condones al momento de tener relaciones sexuales para evitar VIH. La mayor parte de los hombres manifestaron interés sobre la enfermedad.

Sin embargo, algunas percepciones pueden llevar a conductas de riesgo para contagiarse de este virus, tales como compartir utensilios personales, considerar que hay tratamientos preventivos para el VIH, por lo que se debe seguir estableciendo medidas para fortalecer prácticas preventivas ante este virus.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 57 de 63

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados se proponen las siguientes recomendaciones:

- Es necesario que se lleven a cabo campañas de concientización entre la población hombre respecto a la importancia de mantenerse informado sobre los factores de riesgo de la enfermedad de VIH.
- Se sugiere que los profesionales de Enfermería lideren estas campañas, en las cuales se deberán difundir y reforzar entre la población hombres, las diversas medidas de autocuidado, tal que se pueda garantizar la prevención de contagio por VIH.
- Con respecto al ámbito investigativo se sugiere continuar realizando estudios como el contenido en este documento. Podría abordarse esta misma temática en los escenarios de otras ciudades del País, con el fin de trazar puentes comparativos. Así mismo, se podrían desarrollar abordajes cualitativos, para aportar información en profundidad en torno a las subjetividades que podrían estar condicionando la percepción de los hombres frente al riesgo de la enfermedad de VIH.
- Se recomienda que estos temas sean objeto de investigación en futuros, proyectos de Investigación, artículos e informes que se lleven a cabo desde el ámbito de las ciencias de la salud en general y, muy en especial, desde la óptica de la Enfermería.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINUE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 58 de 63

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. de Colombia M de S y. PS. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) [Internet]. Gov.co. [citado el 26 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Virus-de-la-inmunodeficiencia-humana-VIH-y-Sindrome-de-la-inmunodeficiencia-adquirida-SIDA.aspx>
2. VIH. Sistema Inmune [Internet]. 2002 [citado el 1 de abril de 2023]; Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/hiv.html>
3. Hoja informativa — Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida [Internet]. Unaid.org. [citado el 11 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet>
4. Alvizo Perera EJ de J, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Mérida, Yucatán, Quintal López R, Universidad Autónoma de Yucatán, Mexico. Estrategias de prevención del VIH/sida en hombres mayas migrantes de Yucatán: aportes desde la mercadotecnia social. Estud Cult Maya [Internet]. 2022 [citado el 26 de febrero de 2023];59:239–63. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742022000100239
5. Cadenillas H, Lariza Y. Nivel de conocimiento y actitud sobre vih-sida del personal policial de la comisaría sectorial pnp Chota, 2020. Universidad Nacional de Cajamarca; 2022. Disponible en: <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/5336>
6. Meneses Rios MO, Jara Duarte VA. Conocimientos sobre VIH y otras ITS en jóvenes adultos de la ciudad de Villavicencio. Universidad Santo Tomás; 2019. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/16910?show=full>
7. Casos de VIH en Cartagena van en aumento este 2022 [Internet]. www.eluniversal.com.co. 2022 [citado el 25 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.co/cartagena/casos-de-vih-en-cartagena-van-en-aumento-este-2022-ge7161787>
8. Infección por el VIH [Internet]. Who.int. [citado el 26 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTÍNE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 59 de 63

9. Calderon BP, Estuardo D, Espejo Jimenez B, Gricelt G, Ricardo MG, Fernandez B. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD [Internet]. Edu.pe. 2020 [citado el 8 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/9675/Perez%20Calderon%20Diego%20%26%20Espejo%20Jimenez%20Grecia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
10. Posada Zapata IC, Universidad de Antioquia, Agudelo Olarte ÉT. Significado del Riesgo de VIH/SIDA para Hombres Homosexuales en Medellín, Colombia. Psykhe (Santiago) [Internet]. 2019 [citado el 26 de febrero de 2023];28(2):1–14. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282019000200107&script=sci_arttext
11. Restrepo-Pineda JE. Comparative analysis of the perceptions of HIV/AIDS by gay and bisexual Colombian men with and without migratory experience. Rev Salud Pública (Bogota) [Internet]. 2016 [citado el 14 de abril de 2023];18(1):13–25. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642016000100002
12. Ceballos M, Hernández F, Delgado L, Romero A, Abad A. Conocimiento y percepción de riesgo de estudiantes de estomatología frente al VIH [Internet]. Bucle L, editor. SciELO. 2022 [citado el 25 de febrero de 2023]. Disponible en: http://sky.sld.cu/sky.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412022000100004
13. Cabrera S, Pérez L, Meré JJ, Pérez D, Miranda C, Cavallieri F. Encuesta en línea de comportamiento sexual y prácticas de prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana en varones gay y hombres que tienen sexo con hombres en Uruguay. Rev Med Urug (Montev) [Internet]. 2022 [citado el 10 de marzo de 2023];38(2). Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S168803902022000201205&script=sci_arttext.
14. Tamayo-Buendía Margarita, Chaparro-Reyes Daniela, Charry-Anzola Laura P., Garzón Javier. Hallazgos en piel en pacientes con infección por VIH en Bogotá. Rev. salud pública [Internet]. 2021 Dec [cited 2023 Feb 26] ; 23(6): e206. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642021000600206&lng=en. Epub Aug 22, 2022.

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINUE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 60 de 63

<https://doi.org/10.15446/rsap.v23n6.87995>

15. Marín Posada S, Posada Zapata IC. Menosprecio y riesgo en hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH en Medellín. Hacia Promoc Salud [Internet]. 2020 [citado el 26 de febrero de 2023];25(1):13–28. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772020000100013
16. Principal I. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS EN HOMBRES CON DIAGNÓSTICO DE VIH DE UNA IPS DE CARTAGENA [Internet]. Edu.co. [citado el 14 de abril de 2023]. Disponible en: https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/8142/VIH-INFORME-CORREGIDO_220419%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
17. Edu.co. [citado el 14 de abril de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/11670/Pedro%20Caraballo%20Firmado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
18. Paola S, Jácome C. Factores de riesgo para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Ecuador. Universidad Técnica de Ambato/Facultad de Ciencias de la Salud/Carrera de Enfermería; 2021. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/32400>.
19. World Health Organization (WHO) [Internet]. VIH/SIDA; [consultado el 11 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/hiv-aids>.
20. Chuquimango V, Yulisa P. Conocimiento sobre VIH/SIDA y actitudes sexuales en adolescentes de instituciones públicas de Cajamarca, 2020. Universidad Nacional de Cajamarca; 2022. Disponible en: <https://app.bibguru.com/p/30e41881-1202-457f-ae2c-bedb05660b8e>
21. Hernández M, Ramírez L, Lucero D. Conocimiento y practica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes. [Internet]. Repositorio institucional digital. [cited 2023 Abril 13]. Disponible en: <http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/6640>

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTINUE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO		Código	FT-IV-015
			Versión	3
	Fecha	30/09/2022	Página	Página 61 de 63

22. Significado de Hombre [Internet]. Significados. 2014 [citado el 9 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.significados.com/hombre/>
23. VIH/SIDA [Internet]. Who.int. [citado el 9 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/hiv-aids>
24. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) [Internet]. Hiv.gov. [citado el 9 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://clinicalinfo.hiv.gov/es/glossary/sindrome-de-inmunodeficiencia-adquirida-sida>
25. Percepción [Internet]. Concepto. [citado el 9 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://concepto.de/percepcion/>
26. Bravo Salinas SE, Carrión Ordoñez JI, Guerra Ortega DL. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. En: Medicina de Urgencias Tomo 2. PUERTO MADERO EDITORIAL; 2022 [citado el 9 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/sexually-transmitted-infections#tab=tab_1
27. Significado de Salud [Internet]. Significados. 2014 [citado el 9 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.significados.com/salud/>
28. Martínez A. Riesgo [Internet]. Concepto de - Definición de. ConceptoDefinicion.de; 2020 [citado el 9 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://conceptoDefinicion.de/riesgo/>
29. Sanitas. Qué es una enfermedad [Internet]. Sanitas. [citado el 11 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/que-es-una-enfermedad.html>
30. Diccionario de cáncer del NCI [Internet]. Instituto Nacional del Cáncer. 2011 [citado el 11 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/morbilidad>
31. Significado de Morbilidad [Internet]. Significados. 2014 [citado el 11 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.significados.com/morbilidad/>
32. Mortalidad [Internet]. Gob.pa. [citado el 11 de abril de 2023]. Disponible en: https://www.inec.gob.pa/redpan/sid/glosario/WebHelp/Mortalidad_1.htm

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 62 de 63

33. Arturo C, Álvarez M, Surcolombiana U, De F, Sociales C, Humanas Y, et al. (2011) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA Guía didáctica [Internet]. Available from: <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>
34. Ortega C. (2018) ¿Qué es el muestreo por conveniencia? [Internet]. [citado el 15 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-por-conveniencia/>
35. Castillo Tafur. M, nivel de conocimiento y percepción de riesgo sobre Vih/sida en adolescentes, institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo, chachapoyas, 2017, [Internet]. [file:///C:/Users/57302/Downloads/vih%20instrumento%20Geidy%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/57302/Downloads/vih%20instrumento%20Geidy%20(1).pdf)
36. Resolución 8430 de 1993, [Internet] <file:///C:/Users/57302/Downloads/RESOLUCION-8430-DE-1993.pdf>
37. Pérez Calderón DE, Espejo Jiménez GG. Nivel de conocimientos, actitudes y percepciones frente al VIH/SIDA en varones homosexuales del programa Certis, Chiclayo, agosto - septiembre del 2020. Universidad Señor de Sipán[Internet]; 2022.Disponible en : <https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/9675>
38. Cadenillas H, Lariza Y. Nivel de conocimiento y actitud sobre vih-sida del personal policial de la comisaría sectorial pnp Chota, 2020. Universidad Nacional de Cajamarca; 2022. Disponible en: <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/5336>
39. Cabrera Susana, Pérez Lucía, Meré Juan José, Pérez Daniel, Miranda Chiara, Cavallieri Fiorella. Encuesta en línea de comportamiento sexual y prácticas de prevención del virus de inmunodeficiencia humana en varones gais y hombres que tienen sexo con hombres en Uruguay. Rev. Méd. Urug. [Internet]. 2022 Jun [citado 2020 Mayo 14];38(2):e 205.Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902022000201

 <p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ PARA QUE TU DESARROLLO CONTIÑE SU MARCHA</p>	FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO	Código	FT-IV-015
		Versión	3
		Fecha	30/09/2022
		Página	Página 63 de 63

3. Aporte del PAT Colectivo al DHS (Desarrollo Humano Sostenible)

El desarrollo del Pat colectivo de segundo semestre, contribuye a fortalecer las habilidades de las practicas comunitarias en aras de mejorar el papel desempeñado para erradicar por completo una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto constantes como emergentes que se puedan presentar en una comunidad en específico.

4. Aportes puntuales del PAT Colectivo al plan de estudios del programa académico

Impacto del PAT Colectivo en la producción del Programa. De acuerdo con la apreciación del Colectivo Docente, indique como valor agregado, si desde el PAT Colectivo desarrollado entre otros: a) se generará *un artículo, o una presentación en evento (divulgación)*, b) se derivará *un trabajo de grado, o una intervención comunitaria*; c) se convertirá en insumo para Investigación estricta.

Se pretende que esta investigación se convierta en una propuesta de trabajo de grado que logren desarrollar estudiantes del programa de enfermería, así mismo publicar como articulo para así fortalecer la línea de investigación y los insumos adquiridos en la facultad respecto a la investigación.

Nota: Adjuntar la lista de estudiantes participantes en el desarrollo del PAT Colectivo.